

تعریف بیماری:

این عفونت در ساختمان گوش میانی ایجاد شده و معمولاً به دنبال سرما خوردگی ایجاد می شود .

عوامل مستعد کننده :

- ۱- سن ۶ تا ۱۲ ماهگی
- ۲- سابقه خانوادگی عفونت گوش
- ۳- نگهداری کودک در مهد کودک
- ۴- تماس با دود قلبان و سیگار
- ۵- استفاده از پستانک
- ۶- وجود بیماری زمینه ای مثل شکاف کام و یا مونگولیسم
- ۷- مصرف شیر خشک

نکته : مصرف شیر مادر احتمال ابتلا به این بیماری را کاهش می دهد .

علائم و نشانه ها :

در کودکان بزرگتر درد و خارش گوش و کاهش شنوایی ، خروج ترشح از گوش و گاهی تب دیده می شود.

در شیر خواران بیشتر با علائم غیراختصاصی گوش مانند تب ، بی قراری ، شیر نخوردن ، استفراغ و اسهال مراجعه می کنند.

روش های تشخیصی:

معاینه توسط پزشک



آموزش های خود مراقبتی اختصاصی :

- ۱- اجتناب از عوامل مستعد کننده مثل دود سیگار ، قلبان ، پستانک
- ۲- تغذیه کودک با شیر مادر
- ۳- تزریق سالیانه واکسن ویروسی آنفولانزا





اوتیت میانی (otitis media)

کد سند : AA-GCC-PM-07

تاریخ تدوین : ۱۴۰۰/۲/۵

تاریخ ویرایش : زمستان ۱۴۰۳

تاریخ بازنگری بعدی : زمستان ۱۴۰۶

شماره بازنگری : ۱

ناظر علمی : دکتر عقیل میری متفحص اطفال

منبع : پرستاری کودکان ونگ

واحد آموزش و ارتقاء سلامت همگانی

درمان :

۱- کنترل تب و درد با مصرف استامینوفن و بروفن

۲- مصرف داروهای آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک



علائم هشداردهنده بیماری و پیگیری:

۱- در صورت بروز تب، گریه و بیقراری خوب شیر نخوردن، درد گوش و ترشح از گوش به پزشک مراجعه کنید.

۲- در صورت تب و بی قراری طبق نظر پزشک استامینوفن یا برفن مصرف نمایید.

۳- آنتی بیوتیک ها در زمان مشخص و را تا پایان دوره درمان استفاده کنید .

